

1. Sia  $\alpha \in \mathbf{R}$ . La serie numerica  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \left[ \frac{2}{\sqrt{n}} + (-1)^n \right]$

Risp.: **A**: non converge per  $1/2 < \alpha < 1$  **B**: converge solo semplicemente per  $\alpha > 1$  **C**: converge solo semplicemente per  $\alpha > 1/2$  **D**: converge assolutamente per ogni  $\alpha > 1/2$  **E**: converge semplicemente per  $\alpha \geq \frac{1}{2}$  **F**: converge assolutamente per  $\alpha > 1$ , converge semplicemente per  $1/2 < \alpha \leq 1$ , non converge per  $\alpha \leq 1/2$

2. L'insieme di convergenza della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^{nx}}{n9^{n-1}2^{n-1}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$  è

Risp.: **A**:  $(-\infty, 2 + \log_3 2)$  **B**:  $\mathbf{R}$  **C**:  $[-1, \log_3 2]$  **D**:  $\{0\}$  **E**:  $[0, +\infty)$  **F**:  $[1, \log_3 2]$

3. Il raggio di convergenza della serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} 3^n (3 + \cos n)x^n$ ,  $x \in \mathbf{R}$  è

Risp.: **A**:  $R = \frac{1}{2}$  **B**:  $R = \frac{1}{3}$  **C**:  $R = 3$  **D**:  $R = 0$  **E**:  $R = +\infty$  **F**:  $R = \frac{1}{4}$

4. Sia  $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$  la successione di funzioni definita da  $f_n(x) = \frac{\sin(3nx)}{\sqrt{3n}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$ . Delle seguenti affermazioni

- (a)  $\{f_n\}$  converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (b)  $\{f_n\}$  converge solo puntualmente in  $\mathbf{R}$   
 (c)  $\{f_n\}$  non converge in  $\mathbf{R}$  (d)  $\{f'_n\}$  converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (e)  $\{f'_n\}$  converge solo puntualmente in  $\mathbf{R}$   
 (f)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^3 f_n(x) dx = 0$ . Le uniche corrette sono

Risp.: **A**: b d f **B**: a b e **C**: a f **D**: a c d **E**: f c **F**: a e f

5. Sia  $f$  la funzione  $2\pi$ -periodica definita da  $f(x) = \sin(2x^2)$ ,  $|x| \leq \pi$ . Delle seguenti affermazioni

- (a) la sua serie di Fourier converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (b) la sua serie di Fourier converge in media quadratica in  $[-\pi, \pi]$  (c) la sua serie di Fourier è derivabile termine a termine in  $]-\pi, \pi[$  e non in  $[-\pi, \pi]$  (d) la sua serie di Fourier è derivabile termine a termine in  $[-\pi, \pi]$  (e) la serie delle derivate converge a  $f'$  in  $[-\pi, \pi]$  (f) i coefficienti  $b_n = 0, \forall n$ . Le uniche corrette sono

Risp.: **A**: b d f **B**: a b d **C**: a c e f **D**: b c e **E**: a b c f **F**: a d f

6. Sia  $\alpha \in \mathbf{R}$ . L'integrale improprio  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt{(x+1) \log^\alpha(1+x^2)}} dx$  converge se e solo se

Risp.: **A**:  $0 < \alpha \leq 3$  **B**:  $0 \leq \alpha < 1/2$  **C**:  $\alpha < 1/2$  **D**:  $\alpha \leq 1/2$  **E**:  $\alpha \geq 1/2$  **F**:  $\forall \alpha$

7. La trasformata di Laplace della soluzione del seguente problema di Cauchy  $\begin{cases} y'' - 4y = \cosh^2 x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$  è

Risp.: **A**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2}{p(p^2-4)^2}$  **B**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{2}{(p^2-1)(p+1)^2}$  **C**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p-2}{p(p^2-4)^2}$   
**D**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{4}{(p+1)^2(p-1)^2}$  **E**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2-2}{p(p^2-4)^2}$  **F**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{2p}{(p^2-1)^2}$

8. La trasformata di Fourier per  $\xi \neq 0$  della funzione  $u(x) = x\chi_{[-1,1]}(x)$ ,  $x \in \mathbf{R}$  dove  $\chi_{[-1,1]}$  è la funzione caratteristica di  $[-1, 1]$  è

Risp.: **A**:  $\hat{u}(\xi) = \left( \frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right)$  **B**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2i}{\xi}$  **C**:  $\hat{u}(\xi) = \sin \xi$  **D**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2i}{\xi} \left( \cos \xi - \frac{\sin \xi}{\xi} \right)$   
**E**:  $\hat{u}(\xi) = \cos \xi + \xi$  **F**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2}{\xi} \left( \frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right)$

.....  
Cognome e nome

Firma

---

ANALISI MATEMATICA C

25 luglio 2005

Compito 1

---

- Istruzioni.
1. COMPILARE la parte soprastante la prima riga continua. In particolare, riportare cognome e nome *in stampatello* e la firma sopra la riga punteggiata.
  2. SEGNARE nella tabella riportata in questa pagina, in modo incontrovertibile, la lettera corrispondente alla risposta scelta per ognuna delle domande riportate nel foglio allegato; in caso di correzione, apporre un "SI" vicino alla risposta scelta.
  3. PUNTEGGI: risposta esatta = +4; risposta sbagliata = -1; risposta non data = 0.
  4. PROIBITO usare libri, quaderni, calcolatori.
  5. CONSEGNARE solo questo foglio.
  6. TEMPO a disposizione: 90 min.
- 
- 

*Risposte relative al foglio allegato.*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E
F	F	F	F	F	F	F	F

1. Sia  $\alpha \in \mathbf{R}$ . La serie numerica  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \left[ \frac{3}{\sqrt{n}} + (-1)^n \right]$

Risp.: **A**: converge assolutamente per  $\alpha > 1$ , converge semplicemente per  $1/2 < \alpha \leq 1$ , non converge per  $\alpha \leq 1/2$   
**B**: non converge per  $1/2 < \alpha < 1$  **C**: converge solo semplicemente per  $\alpha > 1$  **D**: converge solo semplicemente per  $\alpha > 1/2$  **E**: converge assolutamente per ogni  $\alpha > 1/2$  **F**: converge semplicemente per  $\alpha \geq \frac{1}{3}$

2. L'insieme di convergenza della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^{nx}}{n9^{n-1}4^{n-1}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$  è

Risp.: **A**:  $\mathbf{R}$  **B**:  $[-1, \log_3 4]$  **C**:  $(-\infty, 2 + \log_3 4]$  **D**:  $\{0\}$  **E**:  $[0, +\infty)$  **F**:  $[1, \log_3 4]$

3. Il raggio di convergenza della serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} 5^n (5 + \cos n)x^n$ ,  $x \in \mathbf{R}$  è

Risp.: **A**:  $R = \frac{1}{4}$  **B**:  $R = 5$  **C**:  $R = \frac{1}{5}$  **D**:  $R = 0$  **E**:  $R = +\infty$  **F**:  $R = \frac{1}{7}$

4. Sia  $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$  la successione di funzioni definita da  $f_n(x) = \frac{\sin(5nx)}{\sqrt{5n}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$ . Delle seguenti affermazioni

(a)  $\{f_n\}$  converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (b)  $\{f_n\}$  converge solo puntualmente in  $\mathbf{R}$   
 (c)  $\{f_n\}$  non converge in  $\mathbf{R}$  (d)  $\{f'_n\}$  converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (e)  $\{f'_n\}$  converge solo puntualmente in  $\mathbf{R}$   
 (f)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^5 f_n(x) dx = 0$ . Le uniche corrette sono

Risp.: **A**: b d f **B**: a b e **C**: a c d **D**: a f **E**: f c **F**: a e f

5. Sia  $f$  la funzione  $2\pi$ -periodica definita da  $f(x) = \sin(3x^2)$ ,  $|x| \leq \pi$ . Delle seguenti affermazioni

(a) la sua serie di Fourier converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (b) la sua serie di Fourier converge in media quadratica in  $[-\pi, \pi]$  (c) la sua serie di Fourier è derivabile termine a termine in  $]-\pi, \pi[$  e non in  $[-\pi, \pi]$  (d) la sua serie di Fourier è derivabile termine a termine in  $[-\pi, \pi]$  (e) la serie delle derivate converge a  $f'$  in  $[-\pi, \pi]$  (f) i coefficienti  $b_n = 0, \forall n$ . Le uniche corrette sono

Risp.: **A**: b d f **B**: a b d **C**: a c e f **D**: b c e **E**: a d f **F**: a b c f

6. Sia  $\alpha \in \mathbf{R}$ . L'integrale improprio  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt{(x+1) \log^\alpha(1+x^3)}} dx$  converge se e solo se

Risp.: **A**:  $0 < \alpha \leq 4$  **B**:  $\alpha < 1/3$  **C**:  $0 \leq \alpha < 1/3$  **D**:  $\alpha \leq 1/3$  **E**:  $\alpha \geq 1/3$  **F**:  $\forall \alpha$

7. La trasformata di Laplace della soluzione del seguente problema di Cauchy  $\begin{cases} y'' - 9y = \cosh^2 x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$  è

Risp.: **A**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2}{p(p^2-4)(p^2-9)}$  **B**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{2}{(p^2-1)(p+1)^2}$  **C**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p-2}{p(p^2-4)(p^2-9)}$   
**D**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{6}{(p+1)^2(p-1)^2}$  **E**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{3p}{(p^2-1)^2}$  **F**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2-2}{p(p^2-4)(p^2-9)}$

8. La trasformata di Fourier per  $\xi \neq 0$  della funzione  $u(x) = x\chi_{[-1,1]}(x)$ ,  $x \in \mathbf{R}$  dove  $\chi_{[-1,1]}$  è la funzione caratteristica di  $[-1, 1]$  è

Risp.: **A**:  $\hat{u}(\xi) = \left( \frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right)$  **B**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2i}{\xi}$  **C**:  $\hat{u}(\xi) = \sin \xi$  **D**:  $\hat{u}(\xi) = \cos \xi + \xi$   
**E**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2i}{\xi} \left( \cos \xi - \frac{\sin \xi}{\xi} \right)$  **F**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2}{\xi} \left( \frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right)$

.....  
Cognome e nome

Firma

---

ANALISI MATEMATICA C

25 luglio 2005

Compito 2

---

- Istruzioni.
1. COMPILARE la parte soprastante la prima riga continua. In particolare, riportare cognome e nome *in stampatello* e la firma sopra la riga punteggiata.
  2. SEGNARE nella tabella riportata in questa pagina, in modo incontrovertibile, la lettera corrispondente alla risposta scelta per ognuna delle domande riportate nel foglio allegato; in caso di correzione, apporre un "SI" vicino alla risposta scelta.
  3. PUNTEGGI: risposta esatta = +4; risposta sbagliata = -1; risposta non data = 0.
  4. PROIBITO usare libri, quaderni, calcolatori.
  5. CONSEGNARE solo questo foglio.
  6. TEMPO a disposizione: 90 min.
- 
- 

*Risposte relative al foglio allegato.*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E
F	F	F	F	F	F	F	F

1. Sia  $\alpha \in \mathbf{R}$ . La serie numerica  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \left[ \frac{4}{\sqrt{n}} + (-1)^n \right]$

Risp.: **A**: non converge per  $1/2 < \alpha < 1$  **B**: converge assolutamente per  $\alpha > 1$ , converge semplicemente per  $1/2 < \alpha \leq 1$ , non converge per  $\alpha \leq 1/2$  **C**: converge solo semplicemente per  $\alpha > 1$  **D**: converge solo semplicemente per  $\alpha > 1/2$  **E**: converge assolutamente per ogni  $\alpha > 1/2$  **F**: converge semplicemente per  $\alpha \geq \frac{1}{4}$

2. L'insieme di convergenza della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^{nx}}{n9^{n-1}6^{n-1}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$  è

Risp.: **A**:  $\mathbf{R}$  **B**:  $[-1, \log_3 6]$  **C**:  $\{0\}$  **D**:  $[0, +\infty)$  **E**:  $(-\infty, 2 + \log_3 6]$  **F**:  $[1, \log_3 6]$

3. Il raggio di convergenza della serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} 7^n (7 + \cos n)x^n$ ,  $x \in \mathbf{R}$  è

Risp.: **A**:  $R = \frac{1}{6}$  **B**:  $R = 7$  **C**:  $R = 0$  **D**:  $R = +\infty$  **E**:  $R = \frac{1}{10}$  **F**:  $R = \frac{1}{7}$

4. Sia  $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$  la successione di funzioni definita da  $f_n(x) = \frac{\sin(7nx)}{\sqrt{7n}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$ . Delle seguenti affermazioni

- (a)  $\{f_n\}$  converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (b)  $\{f_n\}$  converge solo puntualmente in  $\mathbf{R}$   
 (c)  $\{f_n\}$  non converge in  $\mathbf{R}$  (d)  $\{f'_n\}$  converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (e)  $\{f'_n\}$  converge solo puntualmente in  $\mathbf{R}$   
 (f)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^7 f_n(x) dx = 0$ . Le uniche corrette sono

Risp.: **A**: b d f **B**: a b e **C**: a c d **D**: f c **E**: a e f **F**: a f

5. Sia  $f$  la funzione  $2\pi$ -periodica definita da  $f(x) = \sin(4x^2)$ ,  $|x| \leq \pi$ . Delle seguenti affermazioni

- (a) la sua serie di Fourier converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (b) la sua serie di Fourier converge in media quadratica in  $[-\pi, \pi]$  (c) la sua serie di Fourier è derivabile termine a termine in  $]-\pi, \pi[$  e non in  $[-\pi, \pi]$  (d) la sua serie di Fourier è derivabile termine a termine in  $[-\pi, \pi]$  (e) la serie delle derivate converge a  $f'$  in  $[-\pi, \pi]$  (f) i coefficienti  $b_n = 0, \forall n$ . Le uniche corrette sono

Risp.: **A**: b d f **B**: a b d **C**: a c e f **D**: a b c f **E**: b c e **F**: a d f

6. Sia  $\alpha \in \mathbf{R}$ . L'integrale improprio  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt{(x+1) \log^\alpha(1+x^4)}} dx$  converge se e solo se

Risp.: **A**:  $0 < \alpha \leq 5$  **B**:  $0 \leq \alpha < 1/4$  **C**:  $\alpha < 1/4$  **D**:  $\alpha \leq 1/4$  **E**:  $\alpha \geq 1/4$  **F**:  $\forall \alpha$

7. La trasformata di Laplace della soluzione del seguente problema di Cauchy  $\begin{cases} y'' - 16y = \cosh^2 x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$  è

Risp.: **A**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2}{p(p^2-4)(p^2-16)}$  **B**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2-2}{p(p^2-4)(p^2-16)}$  **C**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{2}{(p^2-1)(p+1)^2}$   
**D**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p-2}{p(p^2-4)(p^2-16)}$  **E**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{8}{(p+1)^2(p-1)^2}$  **F**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{4p}{(p^2-1)^2}$

8. La trasformata di Fourier per  $\xi \neq 0$  della funzione  $u(x) = x\chi_{[-1,1]}(x)$ ,  $x \in \mathbf{R}$  dove  $\chi_{[-1,1]}$  è la funzione caratteristica di  $[-1, 1]$  è

Risp.: **A**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2i}{\xi} \left( \cos \xi - \frac{\sin \xi}{\xi} \right)$  **B**:  $\hat{u}(\xi) = \left( \frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right)$  **C**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2i}{\xi}$  **D**:  $\hat{u}(\xi) = \sin \xi$   
**E**:  $\hat{u}(\xi) = \cos \xi + \xi$  **F**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2}{\xi} \left( \frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right)$

.....  
Cognome e nome

Firma

---

ANALISI MATEMATICA C

25 luglio 2005

Compito 3

---

- Istruzioni.
1. COMPILARE la parte soprastante la prima riga continua. In particolare, riportare cognome e nome *in stampatello* e la firma sopra la riga punteggiata.
  2. SEGNARE nella tabella riportata in questa pagina, in modo incontrovertibile, la lettera corrispondente alla risposta scelta per ognuna delle domande riportate nel foglio allegato; in caso di correzione, apporre un "SI" vicino alla risposta scelta.
  3. PUNTEGGI: risposta esatta = +4; risposta sbagliata = -1; risposta non data = 0.
  4. PROIBITO usare libri, quaderni, calcolatori.
  5. CONSEGNARE solo questo foglio.
  6. TEMPO a disposizione: 90 min.
- 
- 

*Risposte relative al foglio allegato.*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E
F	F	F	F	F	F	F	F

1. Sia  $\alpha \in \mathbf{R}$ . La serie numerica  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \left[ \frac{5}{\sqrt{n}} + (-1)^n \right]$

Risp.: **A**: non converge per  $1/2 < \alpha < 1$  **B**: converge solo semplicemente per  $\alpha > 1$  **C**: converge solo semplicemente per  $\alpha > 1/2$  **D**: converge assolutamente per ogni  $\alpha > 1/2$  **E**: converge assolutamente per  $\alpha > 1$ , converge semplicemente per  $1/2 < \alpha \leq 1$ , non converge per  $\alpha \leq 1/2$  **F**: converge semplicemente per  $\alpha \geq \frac{1}{5}$

2. L'insieme di convergenza della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^{nx}}{n9^{n-1}8^{n-1}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$  è

Risp.: **A**:  $\mathbf{R}$  **B**:  $[-1, \log_3 8]$  **C**:  $(-\infty, 2 + \log_3 8]$  **D**:  $\{0\}$  **E**:  $[0, +\infty)$  **F**:  $[1, \log_3 8]$

3. Il raggio di convergenza della serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} 9^n (9 + \cos n)x^n$ ,  $x \in \mathbf{R}$  è

Risp.: **A**:  $R = \frac{1}{8}$  **B**:  $R = \frac{1}{9}$  **C**:  $R = 9$  **D**:  $R = 0$  **E**:  $R = +\infty$  **F**:  $R = \frac{1}{13}$

4. Sia  $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$  la successione di funzioni definita da  $f_n(x) = \frac{\sin(9nx)}{\sqrt{9n}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$ . Delle seguenti affermazioni

- (a)  $\{f_n\}$  converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (b)  $\{f_n\}$  converge solo puntualmente in  $\mathbf{R}$   
 (c)  $\{f_n\}$  non converge in  $\mathbf{R}$  (d)  $\{f'_n\}$  converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (e)  $\{f'_n\}$  converge solo puntualmente in  $\mathbf{R}$   
 (f)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^9 f_n(x) dx = 0$ . Le uniche corrette sono

Risp.: **A**: b d f **B**: a b e **C**: a c d **D**: a f **E**: f c **F**: a e f

5. Sia  $f$  la funzione  $2\pi$ -periodica definita da  $f(x) = \sin(5x^2)$ ,  $|x| \leq \pi$ . Delle seguenti affermazioni

- (a) la sua serie di Fourier converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (b) la sua serie di Fourier converge in media quadratica in  $[-\pi, \pi]$  (c) la sua serie di Fourier è derivabile termine a termine in  $]-\pi, \pi[$  e non in  $[-\pi, \pi]$  (d) la sua serie di Fourier è derivabile termine a termine in  $[-\pi, \pi]$  (e) la serie delle derivate converge a  $f'$  in  $[-\pi, \pi]$  (f) i coefficienti  $b_n = 0, \forall n$ . Le uniche corrette sono

Risp.: **A**: b d f **B**: a b d **C**: a c e f **D**: b c e **E**: a b c f **F**: a d f

6. Sia  $\alpha \in \mathbf{R}$ . L'integrale improprio  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt{(x+1) \log^\alpha(1+x^5)}} dx$  converge se e solo se

Risp.: **A**:  $0 < \alpha \leq 6$  **B**:  $0 \leq \alpha < 1/5$  **C**:  $\alpha \leq 1/5$  **D**:  $\alpha \geq 1/5$  **E**:  $\forall \alpha$  **F**:  $\alpha < 1/5$

7. La trasformata di Laplace della soluzione del seguente problema di Cauchy  $\begin{cases} y'' - 25y = \cosh^2 x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$  è

Risp.: **A**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2}{p(p^2-4)(p^2-25)}$  **B**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{2}{(p^2-1)(p+1)^2}$  **C**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p-2}{p(p^2-4)(p^2-25)}$   
**D**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{10}{(p+1)^2(p-1)^2}$  **E**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2-2}{p(p^2-4)(p^2-25)}$  **F**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{5p}{(p^2-1)^2}$

8. La trasformata di Fourier per  $\xi \neq 0$  della funzione  $u(x) = x\chi_{[-1,1]}(x)$ ,  $x \in \mathbf{R}$  dove  $\chi_{[-1,1]}$  è la funzione caratteristica di  $[-1, 1]$  è

Risp.: **A**:  $\hat{u}(\xi) = \left( \frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right)$  **B**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2i}{\xi} \left( \cos \xi - \frac{\sin \xi}{\xi} \right)$  **C**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2i}{\xi}$  **D**:  $\hat{u}(\xi) = \sin \xi$   
**E**:  $\hat{u}(\xi) = \cos \xi + \xi$  **F**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2}{\xi} \left( \frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right)$

.....  
Cognome e nome

Firma

---

ANALISI MATEMATICA C

25 luglio 2005

Compito 4

---

- Istruzioni.
1. COMPILARE la parte soprastante la prima riga continua. In particolare, riportare cognome e nome *in stampatello* e la firma sopra la riga punteggiata.
  2. SEGNARE nella tabella riportata in questa pagina, in modo incontrovertibile, la lettera corrispondente alla risposta scelta per ognuna delle domande riportate nel foglio allegato; in caso di correzione, apporre un "SI" vicino alla risposta scelta.
  3. PUNTEGGI: risposta esatta = +4; risposta sbagliata = -1; risposta non data = 0.
  4. PROIBITO usare libri, quaderni, calcolatori.
  5. CONSEGNARE solo questo foglio.
  6. TEMPO a disposizione: 90 min.
- 
- 

*Risposte relative al foglio allegato.*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E
F	F	F	F	F	F	F	F

1. Sia  $\alpha \in \mathbf{R}$ . La serie numerica  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \left[ \frac{6}{\sqrt{n}} + (-1)^n \right]$

Risp.: **A**: converge assolutamente per  $\alpha > 1$ , converge semplicemente per  $1/2 < \alpha \leq 1$ , non converge per  $\alpha \leq 1/2$   
**B**: non converge per  $1/2 < \alpha < 1$  **C**: converge solo semplicemente per  $\alpha > 1$  **D**: converge solo semplicemente per  $\alpha > 1/2$  **E**: converge assolutamente per ogni  $\alpha > 1/2$  **F**: converge semplicemente per  $\alpha \geq \frac{1}{6}$

2. L'insieme di convergenza della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^{nx}}{n9^{n-1}10^{n-1}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$  è

Risp.: **A**:  $\mathbf{R}$  **B**:  $[-1, \log_3 10]$  **C**:  $\{0\}$  **D**:  $(-\infty, 2 + \log_3 10]$  **E**:  $[0, +\infty)$  **F**:  $[1, \log_3 10]$

3. Il raggio di convergenza della serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} 11^n (11 + \cos n)x^n$ ,  $x \in \mathbf{R}$  è

Risp.: **A**:  $R = \frac{1}{10}$  **B**:  $R = 11$  **C**:  $R = 0$  **D**:  $R = \frac{1}{11}$  **E**:  $R = +\infty$  **F**:  $R = \frac{1}{16}$

4. Sia  $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$  la successione di funzioni definita da  $f_n(x) = \frac{\sin(11nx)}{\sqrt{11n}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$ . Delle seguenti affermazioni

(a)  $\{f_n\}$  converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (b)  $\{f_n\}$  converge solo puntualmente in  $\mathbf{R}$   
 (c)  $\{f_n\}$  non converge in  $\mathbf{R}$  (d)  $\{f'_n\}$  converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (e)  $\{f'_n\}$  converge solo puntualmente in  $\mathbf{R}$   
 (f)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{11} f_n(x) dx = 0$ . Le uniche corrette sono

Risp.: **A**: b d f **B**: a b e **C**: a c d **D**: f c **E**: a e f **F**: a f

5. Sia  $f$  la funzione  $2\pi$ -periodica definita da  $f(x) = \sin(6x^2)$ ,  $|x| \leq \pi$ . Delle seguenti affermazioni

(a) la sua serie di Fourier converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (b) la sua serie di Fourier converge in media quadratica in  $[-\pi, \pi]$  (c) la sua serie di Fourier è derivabile termine a termine in  $]-\pi, \pi[$  e non in  $[-\pi, \pi]$  (d) la sua serie di Fourier è derivabile termine a termine in  $[-\pi, \pi]$  (e) la serie delle derivate converge a  $f'$  in  $[-\pi, \pi]$  (f) i coefficienti  $b_n = 0, \forall n$ . Le uniche corrette sono

Risp.: **A**: b d f **B**: a b d **C**: a c e f **D**: b c e **E**: a d f **F**: a b c f

6. Sia  $\alpha \in \mathbf{R}$ . L'integrale improprio  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt{(x+1) \log^\alpha(1+x^6)}} dx$  converge se e solo se

Risp.: **A**:  $0 < \alpha \leq 7$  **B**:  $\alpha < 1/6$  **C**:  $0 \leq \alpha < 1/6$  **D**:  $\alpha \leq 1/6$  **E**:  $\alpha \geq 1/6$  **F**:  $\forall \alpha$

7. La trasformata di Laplace della soluzione del seguente problema di Cauchy  $\begin{cases} y'' - 36y = \cosh^2 x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$  è

Risp.: **A**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2}{p(p^2-4)(p^2-36)}$  **B**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{2}{(p^2-1)(p+1)^2}$  **C**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2-2}{p(p^2-4)(p^2-36)}$   
**D**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p-2}{p(p^2-4)(p^2-36)}$  **E**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{12}{(p+1)^2(p-1)^2}$  **F**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{6p}{(p^2-1)^2}$

8. La trasformata di Fourier per  $\xi \neq 0$  della funzione  $u(x) = x\chi_{[-1,1]}(x)$ ,  $x \in \mathbf{R}$  dove  $\chi_{[-1,1]}$  è la funzione caratteristica di  $[-1, 1]$  è

Risp.: **A**:  $\hat{u}(\xi) = \left( \frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right)$  **B**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2i}{\xi}$  **C**:  $\hat{u}(\xi) = \sin \xi$  **D**:  $\hat{u}(\xi) = \cos \xi + \xi$   
**E**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2i}{\xi} \left( \cos \xi - \frac{\sin \xi}{\xi} \right)$  **F**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2}{\xi} \left( \frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right)$

.....  
Cognome e nome

Firma

---

ANALISI MATEMATICA C

25 luglio 2005

Compito 5

---

- Istruzioni.
1. COMPILARE la parte soprastante la prima riga continua. In particolare, riportare cognome e nome *in stampatello* e la firma sopra la riga punteggiata.
  2. SEGNARE nella tabella riportata in questa pagina, in modo incontrovertibile, la lettera corrispondente alla risposta scelta per ognuna delle domande riportate nel foglio allegato; in caso di correzione, apporre un "SI" vicino alla risposta scelta.
  3. PUNTEGGI: risposta esatta = +4; risposta sbagliata = -1; risposta non data = 0.
  4. PROIBITO usare libri, quaderni, calcolatori.
  5. CONSEGNARE solo questo foglio.
  6. TEMPO a disposizione: 90 min.
- 
- 

*Risposte relative al foglio allegato.*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E
F	F	F	F	F	F	F	F

1. Sia  $\alpha \in \mathbf{R}$ . La serie numerica  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \left[ \frac{7}{\sqrt{n}} + (-1)^n \right]$

Risp.: **A**: non converge per  $1/2 < \alpha < 1$  **B**: converge assolutamente per  $\alpha > 1$ , converge semplicemente per  $1/2 < \alpha \leq 1$ , non converge per  $\alpha \leq 1/2$  **C**: converge solo semplicemente per  $\alpha > 1$  **D**: converge solo semplicemente per  $\alpha > 1/2$  **E**: converge assolutamente per ogni  $\alpha > 1/2$  **F**: converge semplicemente per  $\alpha \geq \frac{1}{7}$

2. L'insieme di convergenza della serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^{nx}}{n9^{n-1}12^{n-1}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$  è

Risp.: **A**:  $\mathbf{R}$  **B**:  $[-1, \log_3 12]$  **C**:  $\{0\}$  **D**:  $[0, +\infty)$  **E**:  $(-\infty, 2 + \log_3 12]$  **F**:  $[1, \log_3 12]$

3. Il raggio di convergenza della serie di potenze  $\sum_{n=0}^{+\infty} 13^n (13 + \cos n)x^n$ ,  $x \in \mathbf{R}$  è

Risp.: **A**:  $R = \frac{1}{12}$  **B**:  $R = 13$  **C**:  $R = 0$  **D**:  $R = +\infty$  **E**:  $R = \frac{1}{19}$  **F**:  $R = \frac{1}{13}$

4. Sia  $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$  la successione di funzioni definita da  $f_n(x) = \frac{\sin(13nx)}{\sqrt{13n}}$ ,  $x \in \mathbf{R}$ . Delle seguenti affermazioni

- (a)  $\{f_n\}$  converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (b)  $\{f_n\}$  converge solo puntualmente in  $\mathbf{R}$   
 (c)  $\{f_n\}$  non converge in  $\mathbf{R}$  (d)  $\{f'_n\}$  converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (e)  $\{f'_n\}$  converge solo puntualmente in  $\mathbf{R}$   
 (f)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{13} f_n(x) dx = 0$ . Le uniche corrette sono

Risp.: **A**: a f **B**: b d f **C**: a b e **D**: a c d **E**: f c **F**: a e f

5. Sia  $f$  la funzione  $2\pi$ -periodica definita da  $f(x) = \sin(7x^2)$ ,  $|x| \leq \pi$ . Delle seguenti affermazioni

- (a) la sua serie di Fourier converge uniformemente in  $\mathbf{R}$  (b) la sua serie di Fourier converge in media quadratica in  $[-\pi, \pi]$  (c) la sua serie di Fourier è derivabile termine a termine in  $]-\pi, \pi[$  e non in  $[-\pi, \pi]$  (d) la sua serie di Fourier è derivabile termine a termine in  $[-\pi, \pi]$  (e) la serie delle derivate converge a  $f'$  in  $[-\pi, \pi]$  (f) i coefficienti  $b_n = 0, \forall n$ . Le uniche corrette sono

Risp.: **A**: a b c f **B**: b d f **C**: a b d **D**: a c e f **E**: b c e **F**: a d f

6. Sia  $\alpha \in \mathbf{R}$ . L'integrale improprio  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\sqrt{(x+1) \log^\alpha(1+x^7)}} dx$  converge se e solo se

Risp.: **A**:  $0 < \alpha \leq 8$  **B**:  $0 \leq \alpha < 1/7$  **C**:  $\alpha < 1/7$  **D**:  $\alpha \leq 1/7$  **E**:  $\alpha \geq 1/7$  **F**:  $\forall \alpha$

7. La trasformata di Laplace della soluzione del seguente problema di Cauchy  $\begin{cases} y'' - 49y = \cosh^2 x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$  è

Risp.: **A**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2}{p(p^2-4)(p^2-49)}$  **B**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p^2-2}{p(p^2-4)(p^2-49)}$  **C**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{2}{(p^2-1)(p+1)^2}$   
**D**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{p-2}{p(p^2-4)(p^2-49)}$  **E**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{14}{(p+1)^2(p-1)^2}$  **F**:  $\mathcal{L}[y](p) = \frac{7p}{(p^2-1)^2}$

8. La trasformata di Fourier per  $\xi \neq 0$  della funzione  $u(x) = x\chi_{[-1,1]}(x)$ ,  $x \in \mathbf{R}$  dove  $\chi_{[-1,1]}$  è la funzione caratteristica di  $[-1, 1]$  è

Risp.: **A**:  $\hat{u}(\xi) = \left( \frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right)$  **B**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2i}{\xi}$  **C**:  $\hat{u}(\xi) = \sin \xi$  **D**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2i}{\xi} \left( \cos \xi - \frac{\sin \xi}{\xi} \right)$   
**E**:  $\hat{u}(\xi) = \cos \xi + \xi$  **F**:  $\hat{u}(\xi) = \frac{2}{\xi} \left( \frac{\sin \xi}{\xi} - \cos \xi \right)$

.....  
Cognome e nome

Firma

---

ANALISI MATEMATICA C

25 luglio 2005

Compito 6

---

- Istruzioni.
1. COMPILARE la parte soprastante la prima riga continua. In particolare, riportare cognome e nome *in stampatello* e la firma sopra la riga punteggiata.
  2. SEGNARE nella tabella riportata in questa pagina, in modo incontrovertibile, la lettera corrispondente alla risposta scelta per ognuna delle domande riportate nel foglio allegato; in caso di correzione, apporre un "SI" vicino alla risposta scelta.
  3. PUNTEGGI: risposta esatta = +4; risposta sbagliata = -1; risposta non data = 0.
  4. PROIBITO usare libri, quaderni, calcolatori.
  5. CONSEGNARE solo questo foglio.
  6. TEMPO a disposizione: 90 min.
- 
- 

*Risposte relative al foglio allegato.*

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E	E	E
F	F	F	F	F	F	F	F