

Dispense di  
Matematica–Analisi Matematica

Riccarda Rossi

Corso di Laurea in Disegno Industriale

Università degli Studi di Brescia

Anno Accademico 2009/2010



# Capitolo 1

## Nozioni preliminari

### 1.1 Elementi di logica matematica

Una condizione basilare per poter apprendere la matematica è acquisire correttamente il cosiddetto “linguaggio matematico”. In effetti, in matematica la verifica di un’affermazione non avviene sperimentalmente, ma dandone una dimostrazione, e dimostrare un’affermazione (in questo contesto si usa anche il termine *tesi*) significa provarne la verità facendola discendere, attraverso una catena di passaggi logici, da un altro asserto (*ipotesi*), di cui si presuppone la verità. Per poter effettuare correttamente questi passaggi (cioè sviluppare il *processo deduttivo*), è necessario impiegare rigorosamente un linguaggio che non ammetta ambiguità. Tale è il linguaggio matematico, basato sulla logica, della quale è opportuno apprendere i primi rudimenti.

#### 1.1.1 Proposizioni e predicati

Gli oggetti basilari della logica sono le proposizioni.

**Definizione 1.1.1** (Proposizione). *Chiamiamo proposizione una frase di senso compiuto della quale si può inequivocabilmente dire se è vera o falsa. Denotiamo la generica proposizione con i simboli  $\mathcal{P}$  o  $\mathcal{Q}$ .*

- Esempio 1.1.2.**
1.  $\mathcal{P}_1$ : “Quest’aula contiene solo studenti di Disegno Industriale” (VERA);
  2.  $\mathcal{P}_2$ : “Ogni anno, il 17 Settembre a Cremona nevicata” (FALSA);
  3.  $\mathcal{P}_3$ : “Che ora è?” (NON È UNA PROPOSIZIONE);
  4.  $\mathcal{P}_4$ :  $1 + 1 = 2$  (VERA);
  5.  $\mathcal{P}_5$ : “11 è un numero dispari” (VERA);
  6.  $\mathcal{P}_6$ : “60 è un numero primo<sup>1</sup>” (FALSA).....

---

<sup>1</sup>cioè un numero naturale  $n > 1$  i cui unici divisori sono 1 e  $n$ .

**Definizione 1.1.3** (Predicato). *Chiamiamo predicato una frase di senso compiuto che contiene una o più variabili libere. Denotiamo con i simboli  $\mathcal{P}(x)$  o  $\mathcal{Q}(x)$  un predicato dipendente dalla variabile  $x$ , (con  $\mathcal{P}(x, y)$  o  $\mathcal{Q}(x, y)$  un predicato dipendente dalle variabili  $x, y$ , con  $\mathcal{P}(x, y, z)$  o  $\mathcal{Q}(x, y, z)$  un predicato dipendente dalle variabili  $x, y, z, \dots$ )*

Chiaramente, il valore di verità del predicato  $\mathcal{P}(x)$  ( $\mathcal{P}(x, y), \dots$ , risp.) dipende dal valore assunto dalla variabile  $x$  (da  $x, y, \dots$ , risp.). Per trasformare un predicato  $\mathcal{P}(x)$  in una proposizione  $\mathcal{P}$ , è quindi sufficiente assegnare un valore alle variabili libere.

**Esempio 1.1.4.** 1.  $\mathcal{P}_1(x)$ : “L’aula  $x$  contiene solo studenti di Disegno Industriale”;

2.  $\mathcal{P}_2(x, y)$ : “Ogni anno, nel giorno  $x$  e nel luogo  $y$  nevicava”;

3.  $\mathcal{P}_3(x, y)$ :  $x + y = 2$ ;

4.  $\mathcal{P}_4(x)$ : “ $x$  è un numero dispari”;

5.  $\mathcal{P}_5(x)$ : “ $x$  è un numero primo”.....

## 1.1.2 Quantificatori

Un altro modo per rendere i predicati degli oggetti a cui attribuire in modo inequivocabile un valore di verità/falsità è usare i cosiddetti *quantificatori*:

- $\forall$ : che si legge *Per ogni* (**quantificatore universale**);
- $\exists$ : che si legge *Esiste* (**quantificatore esistenziale**);
- $\exists!$ : che si legge *Esiste ed è unico*.

**Esempio 1.1.5.** 1. Consideriamo il predicato “Per ogni numero naturale  $n$ ,  $n$  è primo”. Pur dipendendo da una variabile  $n$ , a questo predicato si può attribuire inequivocabilmente il valore VERO/FALSO, e quindi è di fatto una proposizione. In questo caso, ovviamente tale proposizione è FALSA;

2. “Esiste un numero naturale  $n$  tale che  $n$  è primo” (VERA);

3. “Ogni numero dispari è divisibile per 3” (FALSA).

**Osservazione 1.1.6.** Si noti che

- $\exists$  significa *Esiste almeno uno*,
- $\exists!$  significa *Esiste ed è unico*.

Per esempio:

In alcune zone dello Utah (Stati Uniti) nelle quali è tollerata la poligamia, ogni uomo ha almeno una moglie, mentre ogni donna ha un unico marito.

**Osservazione 1.1.7** (Attenzione all’ordine dei quantificatori). In una proposizione/predicato, è essenziale l’ordine con cui compaiono i vari quantificatori. In altri termini, invertire l’ordine di due quantificatori, di diverso tipo, adiacenti, può alterare, anche pesantemente, il senso della frase. Ad esempio:

- *In ogni luogo c'è almeno un giorno all'anno in cui piove*, che si può scrivere più sinteticamente come

$$\forall \text{luogo} \quad \exists \text{giorno all'anno: piove}$$

(e questa proposizione è VERA). Invertendo l'ordine dei quantificatori si ottiene

$$\exists \text{giorno all'anno: } \forall \text{luogo} \quad \text{piove,}$$

cioè *C'è almeno un giorno all'anno tale che in ogni luogo piove*, che è FALSA.

- A volte la distinzione è più sottile, anche se significativa:

*In questo libro giallo, per ogni assassinio commesso esiste un unico colpevole,*

da confrontarsi con

*In questo libro giallo, esiste un unico colpevole per ogni assassinio commesso.*

- Partiamo da una affermazione FALSA: *Esiste un numero intero più grande di ogni altro numero intero*, cioè

$$\exists y \text{ numero intero: } \forall \text{intero } x \quad y > x.$$

Invertendo l'ordine dei quantificatori otteniamo

$$\forall \text{intero } x \quad \exists y \text{ numero intero: } \quad y > x,$$

che è VERA.

### 1.1.3 Connettivi logici

I connettivi logici che ora introduciamo trasformano una o più proposizioni/predicati in altre proposizioni/predicati, **il cui valore di verità dipende dai valori di verità delle proposizioni di partenza.**

**NON** (negazione): *questo connettivo trasforma una data proposizione  $\mathcal{P}$  (predicato  $\mathcal{P}(x)$ ) nella proposizione  $\text{non}(\mathcal{P})$  (nel predicato  $\text{non}(\mathcal{P}(x))$ ), che ha contenuto contrario a  $\mathcal{P}(\mathcal{P}(x))$ .*

Ad esempio: “Oggi piove” diventa “Oggi non piove”.

- Una sola fra  $\mathcal{P}$  e  $\text{non}(\mathcal{P})$  è vera: vale cioè il principio del terzo escluso<sup>2</sup>
- L'operatore di negazione, applicato due volte, si elide, cioè

$$\text{non}(\text{non}(\mathcal{P})) = \mathcal{P}.$$

Ad esempio: “Non è vero che Bin Laden non sia un criminale” = “Bin Laden è un criminale”.

**E** (congiunzione): *date due proposizioni  $\mathcal{P}$  e  $\mathcal{Q}$ , (due predicati  $\mathcal{P}(x)$  e  $\mathcal{Q}(x)$ ),*

$$\mathcal{P} \text{ e } \mathcal{Q}$$

*è la proposizione nella quale valgono sia la prima, sia la seconda.*

Quindi, “ $\mathcal{P}$  e  $\mathcal{Q}$ ” è vera se e solo se sia  $\mathcal{P}$  sia  $\mathcal{Q}$  sono vere.

Ad esempio: “Oggi piove e fa freddo”.

<sup>2</sup>che caratterizza la cosiddetta logica bivalente, alla base dei calcolatori elettronici.

**O** (disgiunzione): *date due proposizioni  $\mathcal{P}$  e  $\mathcal{Q}$ , (due predicati  $\mathcal{P}(x)$  e  $\mathcal{Q}(x)$ ),*

$$\mathcal{P} \text{ o } \mathcal{Q}$$

*è la proposizione nella quale vale almeno delle due.*

Quindi, “ $\mathcal{P}$  o  $\mathcal{Q}$ ” è vera se e solo almeno una fra  $\mathcal{P}$  o  $\mathcal{Q}$  è vera.

Si noti che, scrivendo  $\mathcal{P} \text{ o } \mathcal{Q}$ , non escludo che siano vere entrambe: in ogni caso, almeno una delle due lo è. Per esempio: se dico che “Ogni mio cugino gioca o a tennis o a basket”, non escludo di avere un cugino molto sportivo che gioca sia a tennis, sia a basket.

$\implies$  (implicazione): *date due proposizioni  $\mathcal{P}$  e  $\mathcal{Q}$ , (due predicati  $\mathcal{P}(x)$  e  $\mathcal{Q}(x)$ ), il connettivo implicazione crea la nuova proposizione  $\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}$ , che si legge*

- “ $\mathcal{P}$  implica  $\mathcal{Q}$ ”,
- “se  $\mathcal{P}$ , allora  $\mathcal{Q}$ ”.

*e che ha il seguente significato: se  $\mathcal{P}$  è vera, anche  $\mathcal{Q}$  è vera.*

Ad esempio:

- “Se l’acqua viene portata alla temperatura di 0 gradi celsius, allora si ghiaccia.”
- “Se un numero naturale  $n$  è divisibile per 4, allora  $n$  è pari.”
- “Se una figura piana è un quadrato, allora le sue diagonali sono perpendicolari.”
- $3x + 5 = 17 \implies x = 4$ .

Si usano anche le seguenti locuzioni per esprimere  $\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}$ :

- “ $\mathcal{P}$  è condizione sufficiente per  $\mathcal{Q}$ ”<sup>3</sup>,
- “ $\mathcal{Q}$  è condizione necessaria per  $\mathcal{P}$ ”<sup>4</sup>.

Ad esempio, la proposizione

“Se fa freddo, accendo il riscaldamento.”

si riesprime come

“Condizione sufficiente affinché io accenda il riscaldamento è che faccia freddo.”

Non si confonda mai “condizione sufficiente” con “condizione necessaria”: per esempio, la proposizione “se passo l’esame di matematica, domani sera ti porto al cinema” equivale a “condizione sufficiente per portarti al cinema è che domani io passi l’esame di matematica”, ed equivale anche a “portarti al cinema è condizione necessaria per la mia promozione all’esame di matematica.” Ha tutt’altro significato la proposizione “Portarti al cinema è una condizione sufficiente affinché io passi l’esame di matematica domani”!!!!

$\iff$  (doppia implicazione): *date due proposizioni  $\mathcal{P}$  e  $\mathcal{Q}$ , (due predicati  $\mathcal{P}(x)$  e  $\mathcal{Q}(x)$ ), il connettivo doppia implicazione crea la nuova proposizione  $\mathcal{P} \iff \mathcal{Q}$ , che equivale a*

$$\mathcal{P} \implies \mathcal{Q} \text{ e } \mathcal{Q} \implies \mathcal{P}$$

*e che si legge “ $\mathcal{P}$  equivale a  $\mathcal{Q}$ ”. In altri termini, la proposizione  $\mathcal{P} \iff \mathcal{Q}$  è vera quando  $\mathcal{P}$  e  $\mathcal{Q}$  hanno lo stesso valore di verità (cioè sono entrambe vere o entrambe false). Altre locuzioni sono*

<sup>3</sup>in altri termini, è sufficiente che valga  $\mathcal{P}$  affinché valga anche  $\mathcal{Q}$ .

<sup>4</sup>in altri termini, se vale  $\mathcal{P}$ , necessariamente deve valere anche  $\mathcal{Q}$ .

- “ $\mathcal{P}$  è condizione necessaria e sufficiente per  $\mathcal{Q}$ ”,
- “ $\mathcal{P}$  se e solo se  $\mathcal{Q}$ ”.

Ad esempio:

- “Condizione necessaria e sufficiente affinché il Brescia vinca contro l’Atalanta è che il Brescia segni un numero di gol strettamente maggiore dell’Atalanta”;
- Dati due numeri reali  $a$  e  $b$ , si ha

$$a \cdot b = 0 \iff a = 0 \text{ o } b = 0.$$

### 1.1.4 Negazione di proposizioni con quantificatori e connettivi

Apprendiamo alcune regole **fondamentali** per

#### Negare proposizioni/predicati contenenti quantificatori:

**NON** ( $\forall$ ) =  $\exists$  **NON**

cioè si hanno le seguenti equivalenze

$$\begin{aligned} \text{non } (\forall x \mathcal{P}(x)) &\iff \text{“non è vero che } \mathcal{P}(x) \text{ è sempre vera”} \\ &\iff \text{“c’è almeno un } x \text{ per il quale } \mathcal{P}(x) \text{ è falsa”} \\ &\iff \exists x : \text{non}(\mathcal{P}(x)). \end{aligned}$$

Ad esempio:

- “Non è vero che ogni ragazzo di questa classe è senza gli occhiali”, cioè “Esiste un ragazzo in questa classe che porta gli occhiali”;
- la negazione di “In Irlanda tutti i giorni dell’anno piove” è la proposizione “C’è almeno un giorno all’anno in Irlanda in cui non piove”.  
Quindi, **per negare che una proprietà sia verificata universalmente bisogna esibire un esempio in cui essa non sia verificata:** si parla allora di un controesempio.

**NON** ( $\exists$ ) =  $\forall$  **NON**

cioè si hanno le seguenti equivalenze

$$\begin{aligned} \text{non } (\exists x \mathcal{P}(x)) &\iff \text{“non è vero che esiste un } x \text{ per cui } \mathcal{P}(x) \text{ è vera”} \\ &\iff \text{“per ogni } x \mathcal{P}(x) \text{ è falsa”} \\ &\iff \forall x : \text{non}(\mathcal{P}(x)). \end{aligned}$$

Ad esempio:

- “Non esiste nessuno stato europeo il cui nome inizi per  $z$ ”, cioè “Tutti gli stati europei hanno nomi che iniziano per lettere diverse da  $z$ ”;
- La negazione di “ $\exists x > 2 : x^2 \leq 4$ ” (FALSA) è “ $\forall x > 2, x^2 \geq 4$ ” (VERA).

**NON**  $(\forall + \exists) = \exists + \forall$  **NON**

cioè si hanno le seguenti equivalenze

$$\begin{aligned} \text{non}(\forall x \exists y : \mathcal{P}(x, y)) &\iff \text{“non è vero che per ogni } x \text{ esiste un } y \text{ tale } \mathcal{P}(x, y) \text{ è vera”} \\ &\iff \text{“esiste un } x \text{ per il quale è falso che [esiste un } y \text{ tale } \mathcal{P}(x, y) \text{ è vera]}” \\ &\iff \text{“esiste un } x \text{ per il quale per ogni } y \mathcal{P}(x, y) \text{ è falsa”} \\ &\iff \exists x : \forall y \text{ non}(\mathcal{P}(x, y)). \end{aligned}$$

Ad esempio: “È falso che ogni padre bresciano abbia almeno una figlia bionda” equivale a “esiste un padre bresciano tale che tutte le sue figlie non sono bionde”..

**NON**  $(\exists + \forall) = \forall + \exists$  **NON**

Ad esempio, la proposizione<sup>5</sup>

“Non (esiste un numero naturale  $x$  tale che per ogni naturale  $y$  si abbia  $y \leq x$ )”

è equivalente a

“per ogni numero naturale  $x$  esiste un numero naturale  $y$  tale che si abbia  $y > x$ ”.

### Negare proposizioni/predicati contenenti connettivi:

$\text{non}(\mathcal{P} \text{ e } \mathcal{Q}) = [\text{non}(\mathcal{P}) \text{ o } \text{non}(\mathcal{Q})]$

Per esempio: “Non è vero che entrambe le figlie del medico sono alte” equivale a “Almeno una delle due figlie del medico non è alta”.

$\text{non}(\mathcal{P} \text{ o } \mathcal{Q}) = [\text{non}(\mathcal{P}) \text{ e } \text{non}(\mathcal{Q})]$

Per esempio: “Non è vero che mio fratello, a cena, mangia carne o pesce” equivale a “A cena, mio fratello non mangia né carne, né pesce”.

$\text{non}(\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}) = [\mathcal{P} \text{ e } \text{non}(\mathcal{Q})]$

Ad esempio: “È falso che Lucia, se prende correnti d’aria fredda, si ammala” equivale a “Lucia prende correnti d’aria fredda e non si ammala”.

Infine, osserviamo che

$$\text{l'implicazione } \mathcal{P} \implies \mathcal{Q} \text{ è equivalente a } [\text{non}(\mathcal{Q}) \implies \text{non}(\mathcal{P})]. \quad (1.1.1)$$

In altri termini, dire  $\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}$ , cioè “ $\mathcal{Q}$  è condizione necessaria per  $\mathcal{P}$ ”, è equivalente a dire “se non vale  $\mathcal{Q}$ , non può valere neppure  $\mathcal{P}$ ”.

### 1.1.5 La dimostrazione per assurdo

L’equivalenza (1.1.1) è alla base della cosiddetta *dimostrazione per assurdo*.

Vogliamo dimostrare che, se assumiamo come vera una data ipotesi  $\mathcal{P}$ , allora vale la tesi  $\mathcal{Q}$ , cioè che  $\mathcal{P} \implies \mathcal{Q}$ . Ciò è equivalente a dimostrare che  $\text{non}(\mathcal{Q}) \implies \text{non}(\mathcal{P})$ . Allora, nella dimostrazione per assurdo si procede così: si parte dall’ipotesi  $\mathcal{P}$ , e si nega la tesi che si vuole dimostrare, cioè  $\text{non}(\mathcal{Q})$ . Dopodiché si sviluppa un ragionamento che porterà a dedurre

<sup>5</sup>che esprime la cosiddetta “proprietà archimedea” dei numeri naturali.

da  $\text{non}(\mathcal{Q})$  che vale  $\text{non}(\mathcal{P})^6$ . Ma  $\mathcal{P}$  e  $\text{non}(\mathcal{P})$  non possono sussistere contemporaneamente. Quindi  $\text{non}(\mathcal{P})$  è FALSA. Abbiamo quindi provato che, assumendo  $\text{non}(\mathcal{Q})$ , si è giunti a  $\text{non}(\mathcal{P})$  (FALSA). Ma allora anche  $\text{non}(\mathcal{Q})$  è FALSA.

Per esempio, dimostriamo il seguente

**Teorema 1.1.8. Ipotesi:** *a e b sono due numeri naturali strettamente positivi, il cui prodotto è un numero dispari.*

**Tesi:** *Sia a sia b sono numeri dispari.*

*Dimostrazione.* Per assurdo, supponiamo che valga l'ipotesi e neghiamo la tesi: quindi

$$a \cdot b \text{ è un numero dispari e almeno uno fra } a \text{ o } b \text{ non è dispari.}$$

Per esempio supponiamo che  $a$  sia pari<sup>7</sup>. Quindi  $a = 2p$ , ove  $p$  è un numero naturale strettamente positivo. Ma allora  $a \cdot b = 2p \cdot b$ , quindi  $a \cdot b$  è un intero pari, contro la nostra ipotesi. Assurdo, quindi vale la tesi.  $\square$

## 1.2 Elementi di teoria degli insiemi

Chiamiamo *insieme* una certa entità composta di oggetti elementari. Sinonimi di *insieme* sono i termini: *collezione*, *famiglia*, *classe*. Gli oggetti che costituiscono un insieme sono detti *elementi*.

**Notazioni.** Useremo:

- una lettera maiuscola (ad es.:  $A, B, C \dots$ ) per denotare un dato insieme,
- lettere minuscole (ad es.:  $a, b, c, x \dots$ ) per denotare gli elementi di insieme.

Dati  $x$  ed  $E$ ,

- $x \in E$  significa “ $x$  appartiene ad  $E$ ”,
- $x \notin E$  significa “ $x$  non appartiene ad  $E$ ”.

Il simbolo  $\emptyset$  denota l'insieme privo di elementi, detto *insieme vuoto*.

Chiamiamo *cardinalità* di un insieme il numero dei suoi elementi.

**Descrizione degli insiemi.** È possibile descrivere un generico insieme in due modi:

1. elencandone tutti gli elementi, con ciascun elemento indicato una sola volta, ad es.  $A = \{-1, 1\}$ . Si noti che l'ordine con cui si elencano gli elementi è inessenziale, pertanto

$$A = \{-1, 1\} = \{1, -1\}.$$

Si noti che  $A$  ha cardinalità 2.

Ulteriori esempi sono i seguenti insiemi numerici:

- (a)  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$ : l'insieme dei *numeri naturali*;

<sup>6</sup>o che vale un'altra affermazione  $\mathcal{R}$  che sappiamo essere FALSA.

<sup>7</sup>procederemmo analogamente se supponessimo  $b$  pari.

- (b)  $\mathbb{Z} = \{\dots, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}$  : l'insieme dei *numeri interi*;  
 (c)  $P = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$  : l'insieme dei *numeri naturali pari*.

Si noti che  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$  e  $P$  hanno infiniti elementi: in tal caso si dice che hanno *cardinalità infinita*.

2. Oppure si può descrivere un insieme come la famiglia di tutti gli elementi verificanti una certa proprietà (o predicato). In altri termini, dato un insieme ambiente  $\mathcal{U}$  e una proprietà  $\mathcal{P}$ , possiamo definire un insieme  $\mathcal{A}$  come la famiglia di tutti gli elementi  $x \in \mathcal{U}$  che rendono vera la proprietà  $\mathcal{P}$ , cioè gli  $x$  per i quali vale  $\mathcal{P}(x)$ <sup>8</sup>:

$$\mathcal{A} := \{x \in \mathcal{U} : \mathcal{P}(x)\} .$$

Ad esempio,

- $\mathcal{A}_1 = \{x \in \mathbb{N} : x < 3\} = \{0, 1, 2\}$ ;
- $\mathcal{A}_2 = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 = 1\} = \{-1, 1\}$ .

**L'inclusione.** Siano  $I, E$  due insiemi. Diciamo che  $E \subset I$  (cioè  $E$  è un *sottoinsieme* di  $I$ , o anche  $E$  è *incluso in*  $I$ ) se

per ogni  $x \in E$  si ha che  $x \in I$

(in simboli:  $x \in E \implies x \in I$ ). Chiaramente, se  $E = I$  si ha in particolare che  $E \subset I$  e  $I \subset E$ . Di fatto, si ha che

$$E = I \iff E \subset I \text{ e } I \subset E .$$

Se  $E \subset I$  e  $E \neq I$ , diciamo che  $E$  è un sottoinsieme proprio di  $I$ ; in simboli, questo si traduce con

$$\forall x \in E, x \in I \quad \text{e} \quad \exists y \in I : y \notin E$$

(la prima proposizione afferma che  $E$  è incluso in  $I$ , e la seconda che  $I$  non è incluso in  $E$ ).

Si conviene che, dato un qualsiasi insieme  $E$ , si abbia  $\emptyset \subset E$  e  $E \subset E$  ( $\emptyset$  e  $E$  vengono detti *sottoinsiemi impropri* di  $E$ ).

**Operazioni fra insiemi.** Dati  $A$  e  $B$  (sottoinsiemi di un certo insieme ambiente che non specifichiamo), possiamo definire i seguenti insiemi:

*l'insieme unione*

$$A \cup B := \{x : x \in A \text{ o } x \in B\};$$

*l'insieme intersezione*

$$A \cap B := \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}$$

(se  $A \cap B = \emptyset$ , si dice che  $A$  e  $B$  sono *disgiunti*);

*l'insieme differenza* (di  $A$  e  $B$ )

$$A \setminus B := \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\} .$$

Se  $A$  e  $X$  sono due insiemi con  $A \subset X$ , allora l'insieme  $X \setminus A$  viene detto *insieme complementare* di  $A$  in  $X$  (e denotato anche con il simbolo  $A^c$ ).

<sup>8</sup>quando si definisce un insieme  $\mathcal{A}$  in questo modo, si usa la notazione  $\mathcal{A} := \dots$ ; il simbolo  $:=$  viene in generale usato nelle definizioni.

Si noti che, mentre  $A \cup B = B \cup A$  e  $A \cap B = B \cap A$  (cioè vale la proprietà commutativa), in generale  $A \setminus B \neq B \setminus A$ .

Ad esempio, consideriamo

1. l'insieme dei numeri naturali pari  $P$  e l'insieme  $D = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$  dei numeri naturali dispari. In questo caso,

$$P \cap D = \emptyset, \quad P \cup D = \mathbb{N}, \quad P \setminus D = P, \quad D \setminus P = D.$$

2. l'insieme dei numeri naturali pari  $P$  e l'insieme  $M$  dei multipli naturali di 4 (cioè  $M = \{x \in \mathbb{N} : x = 4n, n \in \mathbb{N}\}$ ). Allora

$$M \subset P, \quad P \cap M = M, \quad P \cup M = P, \quad M \setminus P = \emptyset.$$

Infine, ricordiamo che, dato un certo insieme  $A$ , l'insieme dei sottoinsiemi di  $A$  viene detto *insieme delle parti* (o *insieme potenza*) di  $A$ , e denotato con il simbolo  $2^A$ . Ad esempio

$$A = \{0, 1, 2\} \implies 2^A = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, A\}. \quad (1.2.1)$$

**Il prodotto cartesiano.** Dati due insiemi  $A$  e  $B$ , non necessariamente distinti, si chiama *prodotto cartesiano* di  $A$  per  $B$  l'insieme delle coppie ordinate  $(a, b)$ , al variare di  $a \in A$  e di  $b \in B$ , cioè

$$A \times B := \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

“Coppie ordinate” significa che l'ordine con cui appare ciascun elemento della coppia è essenziale. Due coppie ordinate  $(a, b)$  e  $(a', b')$  sono uguali se hanno uguali ordinatamente primo e secondo elemento, cioè se  $a = a'$  e  $b = b'$ .

Quindi, dati  $A$  e  $B$ , in generale si ha  $A \times B \neq B \times A$ . Si provi a verificare ciò descrivendo i prodotti cartesiani  $A \times B$  e  $B \times A$ , con  $A = \{a, b, c\}$  e  $B = \{1, 2\}$ .

Se  $A = B$ , useremo la notazione  $A^2$  per  $A \times A$ .

Si può estendere l'operazione di prodotto cartesiano a una  $n$ -upla di insiemi  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , con  $n \geq 2$ , definendo

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n := \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n\}$$

cioè l'insieme delle  $n$ -uple ordinate  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ , al variare di  $a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n$ . Anche in questo caso, se  $A_i \equiv A$  per ogni  $i = 1, 2, \dots, n$ , si usa la notazione  $A \times A \times \dots \times A = A^n$ .

**Il concetto di relazione.** Dati due insiemi non vuoti  $A$  e  $B$ , una *relazione*  $\mathcal{R}$  di  $A$  in  $B$  è per definizione un sottoinsieme non vuoto  $\mathcal{R}$  del prodotto cartesiano  $A \times B$  (se  $A = B$ , un sottoinsieme  $\mathcal{R} \subset A^2$  viene chiamato relazione in  $A$ ). Diciamo che un elemento  $a \in A$  è in relazione con un elemento  $b \in B$  (e scriviamo  $a \mathcal{R} b$ ) se  $(a, b) \in \mathcal{R}$ .

**Esempio 1.2.1.** 1. Se  $A = B$ , l'*insieme diagonale*  $D = \{(a, b) \in A^2 : a = b\}$  corrisponde alla relazione di uguaglianza: in effetti,

$$(a, b) \in D \iff a = b.$$

2. La relazione “ $\leq$ ” nell'insieme dei numeri reali  $\mathbb{N}$  si identifica con l'insieme  $\{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : x \leq y\}$ .

**Definizione 1.2.2.** Diciamo che una relazione  $\mathcal{R}$  di un insieme  $A$  in sé è una relazione d'ordine se gode delle seguenti proprietà:

**riflessività**  $\forall x \in A \quad x \mathcal{R} x$

**antisimmetria**  $\forall x, y \in A \quad [x \mathcal{R} y \text{ e } y \mathcal{R} x] \implies x = y$

**transitività**  $\forall x, y, z \in A \quad [x \mathcal{R} y \text{ e } y \mathcal{R} z] \implies x \mathcal{R} z.$

Inoltre, se una relazione d'ordine  $\mathcal{R}$  gode anche della proprietà

$$\forall x, y \in A \quad x \mathcal{R} y \quad \text{o} \quad y \mathcal{R} x \quad \text{(dicotomia)}$$

allora la relazione d'ordine si dice *totale* e  $A$  viene detto un insieme totalmente ordinato.

**Esempio 1.2.3.** • Si verifica facilmente (esercizio!) che la relazione  $\leq$  in  $\mathbb{N}$  è una relazione d'ordine totale;

- la relazione  $<$  NON è una relazione d'ordine in  $\mathbb{N}$  (verificare!)
- dato un qualsiasi insieme  $A \neq \emptyset$ , la relazione  $\subset$  in  $2^A$  è una relazione d'ordine (esercizio!). In generale,  $\subset$  non è una relazione d'ordine totale (ad es., si veda l'insieme  $A$  in (1.2.1)).

### 1.3 Dai numeri naturali ai numeri razionali

Rivediamo brevemente alcuni fatti elementari sui numeri naturali, interi, e razionali.

**L'insieme dei numeri naturali.**

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

- Possiamo rappresentare geometricamente  $\mathbb{N}$  su una retta, fissando su di essa un punto origine  $O$ , a cui viene associato lo 0, e un secondo punto  $U \neq O$ , a cui si associa il valore 1. Si considera “verso di percorrenza positivo” della retta il verso di percorrenza da  $O$  a  $U$ . La lunghezza del segmento  $OU$  individua un'unità di misura. Riportando il multiplo  $n$  di  $OU$  sulla retta nel verso positivo, si individua il punto associato al numero naturale  $n$ .
- La relazione  $\leq$  è una relazione di ordine totale in  $\mathbb{N}$ .
- Ogni numero naturale  $n$  ha come divisori 1 e  $n$ . Se questi sono i suoi unici divisori,  $n$  viene detto *primo*.

**L'insieme dei numeri interi.** Osserviamo che, dati due numeri naturali  $a, b \in \mathbb{N}$ , l'equazione

$$a + x = b$$

ha una (unica) soluzione  $x \in \mathbb{N}$  se  $b \geq a$ . Se, invece,  $b < a$ , non esiste alcun numero naturale  $x$  che verifichi  $a + x = b$ . Questo fatto motiva l'introduzione dei numeri interi, che si ottengono dai numeri naturali nel seguente modo: ad ogni  $n \in \mathbb{N}$  associamo l'elemento  $x$  tale che  $x + n = 0$ . Denotiamo  $x$  con il simbolo  $-n$  ( $x$  è detto l'*opposto* di  $n$ ) e definiamo

$$\mathbb{Z} := \{\dots, -n, \dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots, n, \dots\}.$$

- Anche  $\mathbb{Z}$  si può rappresentare geometricamente su una retta: riprendendo la retta che rappresenta  $\mathbb{N}$ , al numero intero  $-n$  (con  $n \in \mathbb{N}$ ) viene associato il punto che si ottiene riportando  $n$  volte il segmento unitario  $OU$  nel verso opposto al verso positivo.
- La relazione  $\leq$  è una relazione di ordine totale in  $\mathbb{Z}$ .
- Si ha chiaramente  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ .

**L'insieme dei numeri razionali.** Dati due numeri interi  $a, b \in \mathbb{Z}$ , con  $a \neq 0$ , l'equazione

$$ax = b$$

ha una soluzione  $x \in \mathbb{Z}$  se e solo se  $b$  è un multiplo intero di  $a$ . In caso contrario, non esiste alcun  $x \in \mathbb{Z}$  che la verifichi. Per renderla risolvibile per ogni coppia di interi  $a, b \in \mathbb{Z}$  (con  $a \neq 0$ ), ampliamo l'insieme  $\mathbb{Z}$ , e definiamo

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\},$$

con la convenzione di considerare ogni frazione ridotta ai minimi termini, cioè con numeratore e denominatore privi di denominatori comuni. In altri termini, identifichiamo per esempio  $\frac{1}{3}$  e  $\frac{2}{6}$ ,  $\frac{1}{6}$  e  $\frac{3}{18}$ .

- $\mathbb{Z}$  può essere identificato con il sottoinsieme  $\tilde{\mathbb{Z}}$  di  $\mathbb{Q}$  dato da

$$\tilde{\mathbb{Z}} = \left\{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} : n = 1 \right\}.$$

Con un lieve abuso di notazione, scriviamo quindi  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ .

- Ad ogni  $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$  è possibile associare un unico numero  $y \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$  che verifichi  $xy = 1$ . Il numero  $y$  viene detto *inverso* (o *reciproco*) di  $x$ .
- La relazione d'ordine  $\leq$  si estende a  $\mathbb{Q}$  nel seguente modo:
  - dato un numero razionale  $\frac{m}{n}$ , con  $m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$ , si ha che

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} \geq 0 &\Leftrightarrow m \text{ e } n \text{ hanno lo stesso segno,} \\ \frac{m}{n} \leq 0 &\Leftrightarrow m \text{ e } n \text{ hanno segni diversi.} \end{aligned}$$

- Dati  $\frac{m}{n}$  e  $\frac{p}{q}$  in  $\mathbb{Q}$ , li ordiniamo nel seguente modo:

\* se  $\frac{m}{n}$  e  $\frac{p}{q}$  hanno segno diverso, è immediato confrontarli. Avremo infatti

$$\frac{m}{n} \leq 0 \leq \frac{p}{q} \quad \text{oppure} \quad \frac{p}{q} \leq 0 \leq \frac{m}{n}.$$

\* se  $\frac{m}{n}$  e  $\frac{p}{q}$  sono entrambi positivi, possiamo supporre<sup>9</sup> che  $m \geq 0$  e  $n > 0$  e  $p \geq 0$  e  $q > 0$ . Allora abbiamo che

$$\frac{m}{n} \leq \frac{p}{q} \Leftrightarrow mq \leq pn.$$

<sup>9</sup>in effetti,

$$\frac{3}{5} = \frac{+3}{+5} = \frac{-3}{-5}.$$

\* se  $\frac{m}{n}$  e  $\frac{p}{q}$  sono entrambi negativi, allora ci “appoggiamo” alla relazione d’ordine definita nel caso di numeri razionali positivi:

$$\frac{m}{n} \leq \frac{p}{q} \Leftrightarrow -\frac{p}{q} \leq -\frac{m}{n}.$$

- **Rappresentazione decimale dei numeri razionali.** Ogni numero  $x \in \mathbb{Q}$  può essere espresso in base 10 nella forma

$$x = \pm \left( c_k 10^k + c_{k-1} 10^{k-1} + \dots + c_1 10 + c_0 + c_{-1} 10^{-1} + c_{-2} 10^{-2} + \dots \right) \quad \text{con le cifre } c_i, c_{-j} \in \{0, 1, \dots, 9\}. \quad (1.3.1)$$

Le cifre  $c_i, c_{-j}$  vengono dette *cifre decimali*. Equivalentemente, si può scrivere

$$x = \pm c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0, c_{-1} c_{-2} \dots \quad (1.3.2)$$

Questa è, peraltro, la rappresentazione dei numeri fatta da un calcolatore. Chiamiamo la (1.3.1)/(1.3.2) *rappresentazione (o allineamento) decimale* del numero  $x$ . Osserviamo che, mentre il numero di cifre a sinistra della virgola in (1.3.2) è finito, in generale vi possono essere infinite cifre decimali a destra della virgola.

Si dice che un allineamento decimale è *finito* se vi è un numero finito di cifre a destra della virgola. Ad esempio,

$$\begin{aligned} \frac{18723}{100} &= 187,23 = 1 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10 + 7 + 2 \cdot 10^{-1} + 3 \cdot 10^{-2}, \\ -\frac{1}{6} &= -0,166666666\dots = -(0 + 1 \cdot 10^{-1} + 6 \cdot 10^{-2} + 6 \cdot 10^{-3} + 6 \cdot 10^{-4} \\ &\quad + 6 \cdot 10^{-5} + 6 \cdot 10^{-6} + 6 \cdot 10^{-7} + 6 \cdot 10^{-8} \dots). \end{aligned}$$

Se, in un allineamento decimale (non finito), da una certa posizione decimale in poi un blocco di cifre si ripete indefinitamente, allora l’allineamento viene detto *periodico* e tale blocco è detto *periodo*<sup>10</sup>. Ad esempio,  $-1/6$  ha un allineamento decimale periodico di periodo 6.

Si può dimostrare che ad ogni numero razionale  $x \in \mathbb{Q}$  viene associato uno e un solo allineamento decimale, finito o periodico. Chiaramente, i numeri interi si identificano con gli allineamenti decimali in cui le cifre a destra della virgola sono tutte uguali a zero.

**Dai numeri razionali ai numeri reali.** Fu scoperto dai matematici greci che esistono segmenti la cui lunghezza non può essere espressa mediante numeri razionali. Ad esempio, la lunghezza  $x$  della diagonale del quadrato di lato 1, che, per il teorema di Pitagora, verifica

$$x^2 = 1^2 + 1^2 = 1 + 1 = 2.$$

**Teorema 1.3.1.** *Non esiste un  $x \in \mathbb{Q}$  tale che  $x^2 = 2$ .*

*Dimostrazione.* Per assurdo esista  $x \in \mathbb{Q}$  tale che  $x^2 = 2$ . Rappresentiamo  $x$  nella forma

$$x = \frac{m}{n} \quad \text{con } m, n \in \mathbb{Z} \text{ e } n \neq 0$$

<sup>10</sup>vengono considerati propri i periodi diversi da 9: ad esempio, il numero 0,99999999... viene identificato con 1.

(si intende la frazione ridotta ai minimi termini, cioè  $m$  e  $n$  privi di divisori comuni). Poiché  $x^2 = 2$ , segue che

$$m^2 = 2n^2. \quad (1.3.3)$$

Allora  $m^2$  è un numero pari. Ne consegue che  $m$  è un numero pari<sup>11</sup>. Quindi  $m$  è della forma  $m = 2k$ , con  $k \in \mathbb{Z}$ , e dalla (1.3.3) segue che  $4k^2 = 2n^2$ , cioè  $n^2 = 2k^2$ . Ma allora  $n^2$  è pari, quindi anche  $n$  è pari. Abbiamo pertanto concluso che sia  $m$  sia  $n$  sono pari, cioè divisibili per 2. Ma questo è in contraddizione con il fatto che né  $m$  né  $n$  abbiano divisori comuni. Assurdo.  $\square$

Il Teorema 1.3.1 suggerisce l'esistenza di un'estensione dell'insieme  $\mathbb{Q}$ , in cui l'equazione  $x^2 = 2$  ha una soluzione. Si tratta dell'insieme dei numeri reali.

**Definizione 1.3.2.** Chiamiamo numero reale un (qualsiasi) allineamento decimale, e denotiamo con  $\mathbb{R}$  l'insieme dei numeri reali.

Chiaramente i numeri razionali (che, ribadiamo, si identificano con gli allineamenti decimali finiti o periodici) sono un sottoinsieme di  $\mathbb{R}$ . Si ha dunque  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ . Chiamiamo *numero irrazionale* un numero reale non razionale (rappresentato da un allineamento decimale non finito né periodico). L'insieme dei numeri irrazionali si denota ovviamente con il simbolo  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ . Ad esempio, sono numeri irrazionali  $\pm\sqrt{2}$  (cioè le radici di 2),  $\pi$ , la *costante di Nepero* e (qui approssimata con 55 cifre decimali)

$$e = 2,7182818284590452353602874713526624977572470936999595749 \dots$$

## 1.4 L'insieme dei numeri reali

Le proprietà dell'insieme dei numeri reali che presentiamo in questa sezione sono fondamentali per lo sviluppo del calcolo differenziale e integrale, e vanno quindi ben comprese e assimilate.

### 1.4.1 La relazione d'ordine su $\mathbb{R}$

La relazione d'ordine  $\leq$  si estende anche a  $\mathbb{R}$  nel seguente modo: siano dati due numeri reali  $x$  e  $y$ , rappresentati dagli allineamenti decimali

$$x = \pm (c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0, c_{-1} c_{-2} \dots) \quad y = \pm (c'_k c'_{k-1} \dots c'_1 c'_0, c'_{-1} c'_{-2} \dots).$$

Poiché, in entrambe le rappresentazioni, le cifre a sinistra della virgola rappresentano numeri naturali, per semplicità chiamiamo  $n := c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0$  e  $m := c'_k c'_{k-1} \dots c'_1 c'_0$ . Se  $x$  e  $y$  hanno segno diverso, è immediato confrontarli:

$$\begin{aligned} (x = +n, c_{-1} c_{-2} \dots, \quad y = -m, c'_{-1} c'_{-2} \dots) &\Rightarrow y < 0 < x, \\ (x = -n, c_{-1} c_{-2} \dots, \quad y = +m, c'_{-1} c'_{-2} \dots) &\Rightarrow x < 0 < y, \end{aligned}$$

e, inoltre, se  $x$  e  $y$  sono entrambi negativi (cioè  $x = -n, c_{-1} c_{-2} \dots$  e  $y = -m, c'_{-1} c'_{-2} \dots$ ), si ha che

$$x < y \Leftrightarrow -y < -x.$$

<sup>11</sup>in effetti, se  $m$  fosse dispari (cioè della forma  $m = 2k + 1$ ), allora anche  $m^2 = 4k^2 + 4k + 1$  sarebbe dispari.

Possiamo quindi ridurci al caso in cui  $x$  e  $y$  sono entrambi non negativi, cioè della forma

$$x = +n, c_{-1}c_{-2} \dots \quad y = +m, c'_{-1}c'_{-2} \dots$$

Per confrontarli, basta confrontare le prime cifre decimali diverse dei due numeri. Si ha:

$$n < m \Rightarrow x < y \quad n > m \Rightarrow x > y.$$

Se  $n = m$ , confrontiamo allora le prime cifre decimali a destra della virgola:

$$\begin{cases} c_{-1} < c'_{-1} \Rightarrow x < y, \\ c_{-1} > c'_{-1} \Rightarrow x > y, \end{cases}$$

mentre, se  $c_{-1} = c'_{-1}$ , sarà necessario confrontare le seconde cifre decimali a destra della virgola, con la stessa regola:

$$\begin{cases} c_{-2} < c'_{-2} \Rightarrow x < y, \\ c_{-2} > c'_{-2} \Rightarrow x > y, \end{cases}$$

mentre, se  $c_{-2} = c'_{-2}$ , sarà necessario confrontare le terze cifre decimali a destra della virgola, con la stessa regola, e così via.....

**Notazione.** Disponendo delle relazioni  $\leq$  e  $<$  su  $\mathbb{R}$ , diremo d'ora in poi che un numero  $x \in \mathbb{R}$  è positivo se  $0 \leq x$ , cioè  $x \geq 0$ ; strettamente positivo se  $0 < x$ , cioè  $x > 0$ ; negativo se  $x \leq 0$ ; strettamente negativo se  $x < 0$ . Definiamo

$$\mathbb{R}^+ := \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}, \quad \mathbb{R}^- := \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0\}.$$

**Proprietà della relazione d'ordine.** Ricordiamo le principali proprietà della relazione  $\leq$ :

$$\begin{cases} x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z, \\ x \leq y, z \geq 0 \Rightarrow xz \leq yz, \\ x \leq y, z \leq 0 \Rightarrow xz \geq yz \end{cases} \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}. \quad (1.4.1)$$

Le stesse proprietà valgono per la relazione  $<$ . Inoltre,

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad 0 < x < y \Rightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{y} > 0.$$

## 1.4.2 Il modulo di un numero reale

**Definizione 1.4.1.** Dato  $x \in \mathbb{R}$ , il modulo (o valore assoluto) di  $x$  è il numero reale **positivo** definito da

$$|x| := \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}.$$

**Proprietà del valore assoluto.** Si ha  $\forall a, b \in \mathbb{R}$

$$|a| \geq 0 \text{ e } |a| = 0 \text{ se e solo se } a = 0; \quad (1.4.2a)$$

$$|a| = |-a|; \quad (1.4.2b)$$

$$|ab| = |a||b|; \quad (1.4.2c)$$

$$|a - b| \leq |a| + |b| \text{ e } |a + b| \leq |a| + |b| \quad (1.4.2d)$$

**Disuguaglianze con il valore assoluto.** Ricordiamo che, dati  $a, b \in \mathbb{R}$ , con  $a \geq 0$ ,

$$\begin{aligned} |x - b| \leq a &\Leftrightarrow -a \leq x - b \leq a \\ |x - b| \geq a &\Leftrightarrow x - b \geq a \text{ o } x - b \leq -a \end{aligned}$$

Infine, ricordiamo il seguente fatto

$$\sqrt{x^2} = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (1.4.3)$$

In generale,

$$\text{se } n \text{ è pari} \quad \sqrt[n]{x^n} = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (1.4.4)$$

### 1.4.3 Densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ .

Intuitivamente, questo significa che non solo  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ , ma anche che i numeri razionali sono “fitti” in  $\mathbb{R}$ . Più precisamente, ogni numero  $x \in \mathbb{R}$  può essere approssimato arbitrariamente bene da un numero razionale: in altri termini, comunque si fissi una tolleranza (cioè, un margine d’errore)  $t > 0$ , esiste un numero  $y \in \mathbb{Q}$  tale che  $-t < x - y < t$  (cioè,  $y$  dista da  $x$  meno di  $t$ ). In simboli:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall t > 0 \exists y \in \mathbb{Q} : |x - y| < t. \quad (1.4.5)$$

Se ne deduce che

$$\forall \text{ coppia di numeri reali } x_1 < x_2 \text{ esistono infiniti numeri } q \in \mathbb{Q} \text{ tali che } x_1 < q < x_2. \quad (1.4.6)$$

Si può dimostrare che anche l’insieme  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  è denso (nel senso appena specificato) in  $\mathbb{R}$ .

### 1.4.4 L’assioma di completezza

Per formalizzare l’assioma (o proprietà) di completezza di  $\mathbb{R}$ , introduciamo alcune definizioni.

**Definizione 1.4.2** (Maggiorante). *Consideriamo un insieme  $A \subset \mathbb{R}$ , con  $A \neq \emptyset$ .*

- Si dice che un numero reale  $M \in \mathbb{R}$  è un maggiorante per  $A$  se

$$\forall x \in A, \quad x \leq M.$$

- Se l’insieme dei maggioranti di  $A$  è non vuoto, si dice che  $A$  è limitato superiormente. Se  $A$  è privo di maggioranti, si dice che  $A$  è illimitato superiormente.

Analogamente,

**Definizione 1.4.3** (Minorante). *Sia  $A \subset \mathbb{R}$ , con  $A \neq \emptyset$ .*

- Si dice che un numero reale  $m \in \mathbb{R}$  è un minorante per  $A$  se

$$\forall x \in A, \quad x \geq m.$$

- Se l’insieme dei minoranti di  $A$  è non vuoto, si dice che  $A$  è limitato inferiormente. Se  $A$  è privo di minoranti, si dice che  $A$  è illimitato inferiormente.

**Definizione 1.4.4.** *Sia  $A \subset \mathbb{R}$ , con  $A \neq \emptyset$ . Diciamo che  $A$  è limitato se esso è sia superiormente, sia inferiormente limitato.*

**Esempio 1.4.5.** 1. Si consideri l'insieme

$$A = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x < 1\} .$$

$A$  è limitato superiormente e l'insieme dei maggioranti di  $A$  è:  $\mathcal{M}(A) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$ .  
 $A$  è limitato inferiormente e l'insieme dei minoranti di  $A$  è:  $m(A) = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -1\}$ .

2. Si consideri l'insieme

$$B = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 1\} .$$

$B$  è limitato superiormente e l'insieme dei maggioranti di  $B$  è:  $\mathcal{M}(B) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$ .  
 $B$  è illimitato inferiormente.

3. Si consideri l'insieme

$$C = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \frac{1}{2^n} \ n \in \mathbb{N} \right\} .$$

Si noti che  $C$  ha infiniti elementi e che  $0 \notin C$ .  $C$  è limitato superiormente e l'insieme dei maggioranti di  $C$  è:  $\mathcal{M}(C) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 1\}$ .  $C$  è limitato inferiormente e l'insieme dei minoranti di  $C$  è:  $m(C) = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0\}$ .

4. Si consideri l'insieme

$$D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 2\} .$$

Si noti che  $D$  è l'insieme  $\{x \in \mathbb{R} : -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}\}$ .  $D$  è limitato superiormente e l'insieme dei maggioranti di  $D$  è:  $\mathcal{M}(D) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq \sqrt{2}\}$ .  $D$  è limitato inferiormente e l'insieme dei minoranti di  $D$  è:  $m(D) = \{x \in \mathbb{R} : x \leq -\sqrt{2}\}$ .

### Definizione di estremo superiore di un insieme.

**Definizione 1.4.6.** Sia  $A$  un insieme non vuoto. Diciamo che un numero reale  $M^*$  è l'estremo superiore di  $A$  se valgono (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1.  $M^*$  è un maggiorante per  $A$ ;
2.  $M^* \leq M$  per ogni maggiorante  $M$  di  $A$ <sup>12</sup>.

Useremo la notazione  $M^* = \sup(A)$ .

**Unicità dell'estremo superiore.** Si noti che, nella definizione di *estremo superiore*, è stato usato l'articolo determinativo "il". Questo è dovuto al fatto che, mentre un insieme può avere in generale più di un maggiorante (anche infiniti maggioranti, si veda l'Esempio 1.4.5), **l'estremo superiore di un insieme, se esiste, è unico**. Per dimostrare ciò, supponiamo per assurdo che un dato insieme  $A$  possieda due estremi superiori  $M_1^*$  e  $M_2^*$ , con  $M_1^* \neq M_2^*$ . Per definizione di  $\sup$ , si deve avere  $M_1^* \leq M_2^*$  (in quanto  $M_2^*$  è un maggiorante e  $M_1^*$  il più "piccolo" fra i maggioranti). Ragionando allo stesso modo, si ha  $M_2^* \leq M_1^*$ . Ma allora  $M_1^* = M_2^*$ , in contraddizione con quanto supposto.

Si noti che, nella definizione di *estremo superiore*, non viene richiesto che  $M^*$  appartenga all'insieme  $A$ . Quando ciò accade,  $M^*$  viene detto *massimo* di  $A$ .

**Definizione 1.4.7.** Sia  $A$  un insieme non vuoto e sia  $M^* = \sup(A)$ . Se  $M^* \in A$ , allora diciamo che  $M^*$  è il massimo di  $A$  e scriviamo  $M^* = \max(A)$ .

<sup>12</sup>cioè  $M^*$  è "il più piccolo" fra i maggioranti di  $A$ .

**Definizione di estremo inferiore di un insieme.**

**Definizione 1.4.8.** Sia  $A$  un insieme non vuoto. Diciamo che un numero reale  $m_*$  è l'estremo inferiore di  $A$  se valgono (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1.  $m_*$  è un minorante per  $A$ ;
2.  $m_* \geq m$  per ogni minorante  $m$  di  $A$  <sup>13</sup>.

Useremo la notazione  $m_* = \inf(A)$ .

Ragionando come per il sup, si dimostra che l'inf di un dato insieme, se esiste, è unico.

**Definizione 1.4.9.** Sia  $A$  un insieme non vuoto e sia  $m_* = \inf(A)$ . Se  $m_* \in A$ , allora diciamo che  $m_*$  è il minimo di  $A$  e scriviamo  $m_* = \min(A)$ .

**Esempio 1.4.10.** 1. Si consideri l'insieme

$$A = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x < 1\}.$$

Si ha  $\inf(A) = -1 \in A$  e quindi  $\inf(A) = \min(A) = -1$ . Inoltre,  $\sup(A) = 1 \notin A$ : quindi 1 non è il massimo di  $A$ . Siccome  $\sup A$  è l'unico candidato a essere il massimo di  $A$ , concludiamo che l'insieme  $A$  non ha massimo.

2. Si consideri l'insieme

$$B = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 1\}.$$

Si ha  $\sup(B) = \max(B) = 1$ .

3. Si consideri l'insieme

$$C = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \frac{1}{2^n} \ n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Si ha  $\sup(C) = \max(C) = 1$ . D'altronde,  $\inf(C) = 0 \notin C$ , quindi  $C$  non ha minimo.

4. Si consideri l'insieme

$$D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 2\}.$$

Si ha  $\sup(D) = \max(D) = \sqrt{2}$  e  $\inf(D) = \min(D) = -\sqrt{2}$ .

Questi esempi sembrano suggerire che, non appena un insieme  $A \subset \mathbb{R}$  è superiormente (rispettivamente, inferiormente) limitato, esso ammette sup **in**  $\mathbb{R}$  (resp., inf **in**  $\mathbb{R}$ ). Questo è vero **nell'insieme ambiente**  $\mathbb{R}$ , ed è proprio quanto viene affermato da <sup>14</sup>

**Assioma di completezza per l'insieme dei numeri reali.** Sia  $A \subset \mathbb{R}$  un insieme non vuoto. Se  $A$  è superiormente limitato in  $\mathbb{R}$  (cioè se  $A$  ha almeno un maggiorante), allora  $A$  ha l'estremo superiore **in**  $\mathbb{R}$ .

Analogamente, se  $A$  è inferiormente limitato in  $\mathbb{R}$  (cioè se  $A$  ha almeno un minorante), allora  $A$  ha l'estremo inferiore **in**  $\mathbb{R}$ .

Si noti che l'assioma di completezza **NON** afferma che ogni insieme superiormente limitato in  $\mathbb{R}$  ha il massimo (o che ogni insieme inferiormente limitato in  $\mathbb{R}$  ha il minimo): l'esistenza del massimo (del minimo, risp.) dipende dal fatto che il sup appartenga all'insieme (che l'inf appartenga all'insieme).

<sup>13</sup> cioè  $m_*$  è "il più grande" fra i minoranti di  $A$ .

<sup>14</sup> Assioma significa "proprietà che si accetta per vera, senza dimostrazione".

**Osservazione 1.4.11.** Osserviamo che l'insieme  $\mathbb{Q}$  non gode della proprietà enunciata dall'assioma di completezza: in altri termini, esistono sottoinsiemi di  $\mathbb{Q}$  superiormente limitati (rispettivamente, inferiormente limitati) che non ammettono estremo superiore in  $\mathbb{Q}$  (risp., estremo inferiore in  $\mathbb{Q}$ ). Infatti, consideriamo l'insieme

$$\mathcal{H} = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 \leq 2\}$$

e dimostriamo che esso, pur avendo maggioranti in  $\mathbb{Q}$  (l'insieme dei maggioranti in  $\mathbb{Q}$  per  $\mathcal{H}$  in  $\mathbb{Q}$  è  $\{x \in \mathbb{Q} : x \geq \sqrt{2}\}$ , quindi per esempio i numeri  $\frac{3}{2}$  e 2 sono maggioranti, in  $\mathbb{Q}$ , per  $\mathcal{H}$ ), non ha sup in  $\mathbb{Q}$ <sup>15</sup>.

Notiamo infatti che  $\mathcal{H}$ , essendo un sottoinsieme (superiormente limitato) di  $\mathbb{R}$ , ammette sup in  $\mathbb{R}$ . Chiamiamo  $S := \sup_{\mathbb{R}}(\mathcal{H})$ . È immediato osservare che  $S = \sqrt{2}$ . Ora, per assurdo esista l'estremo superiore  $q \in \mathbb{Q}$  di  $\mathcal{H}$  in  $\mathbb{Q}$  (quindi  $q$  è il “più piccolo” fra tutti i maggioranti di  $\mathcal{H}$  che sono numeri razionali). Necessariamente deve essere  $q \neq \sqrt{2}$ . Inoltre, non è difficile osservare che deve essere  $q > \sqrt{2}$ . Ma allora, per la densità di  $\mathbb{Q}$  in  $\mathbb{R}$  (si ricordi la (1.4.6)) esistono infiniti  $y \in \mathbb{Q}$  con  $\sqrt{2} < y < q$ . Si noti che tali  $y$  sono dei maggioranti razionali per l'insieme  $\mathcal{H}$ , e che essi sono strettamente minori di  $q$ . Questo contraddice il fatto che  $q$  sia l'estremo superiore di  $\mathcal{H}$  in  $\mathbb{Q}$ . Assurdo.

Ne concludiamo che  $\mathcal{H}$  non ammette sup in  $\mathbb{Q}$ .

**Rappresentazione geometrica di  $\mathbb{R}$ .** Gli elementi di  $\mathbb{R}$  si possono rappresentare geometricamente come punti di una retta.

Per fare ciò, si fissa un punto  $O$  (detto origine) sulla retta, al quale viene associato il numero 0, e un altro punto  $U$ . Si conviene che il verso di percorrenza della retta da  $O$  a  $U$  sia considerato il *verso positivo*, e il verso opposto sia preso come verso negativo. In questo modo, vengono individuate sulla retta:

- una semiretta positiva (la semiretta che contiene  $U$ ),
- una semiretta negativa.

Per convenzione, la lunghezza del segmento  $OU$  viene presa come *unità di misura*.

Dopodiché, dato un punto  $P$  sulla retta, a esso viene associato un unico numero reale  $x$  in questo modo: si considera la lunghezza  $\overline{OP}$  del segmento  $OP$  e si definisce

$$x := \begin{cases} \overline{OP} & \text{se } P \text{ appartiene alla semiretta positiva,} \\ -\overline{OP} & \text{se } P \text{ appartiene alla semiretta negativa} \end{cases}.$$

Il numero reale  $x$  viene detto *ascissa* del punto  $P$ . Viceversa, fissato  $x \in \mathbb{R}$ , a esso viene associato uno e un solo punto  $P$  sulla retta in questo modo:

$$\begin{cases} x > 0 & \leftrightarrow & P \text{ nella semiretta positiva tale che } \overline{OP} = x, \\ x < 0 & \leftrightarrow & P \text{ nella semiretta negativa tale che } \overline{OP} = -x, \\ x = 0 & \leftrightarrow & O \end{cases}.$$

D'ora in poi, useremo il termine *retta reale* come sinonimo dell'insieme dei numeri reali.

**Interpretazione geometrica del modulo.** Ricordando che ad ogni  $x \in \mathbb{R}$  è univocamente associato un punto  $P$  sulla retta reale, il numero  $|x|$  è la distanza di  $P$  dall'origine  $O$ .

Più in generale, dati  $x, y \in \mathbb{R}$ , il numero  $|x - y|$  coincide con la distanza fra i corrispondenti punti  $P_x$  e  $P_y$  sulla retta reale.

<sup>15</sup>**Esercizio!:** ragionando allo stesso modo, dimostrare che  $\mathcal{H}$  non ha inf in  $\mathbb{Q}$ , pur avendo minoranti in  $\mathbb{Q}$ .

### 1.4.5 La nozione di intervallo e la retta reale estesa

**Definizione 1.4.12.** Un sottoinsieme  $I \neq \emptyset$  di  $\mathbb{R}$  viene detto intervallo se, presi due qualunque suoi punti  $x < y$ , tutti i punti compresi fra  $x$  e  $y$  appartengono ancora ad  $I$ .

Ad esempio, l'insieme

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\} \quad \text{è un intervallo,}$$

mentre l'insieme

$$B = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\} \quad \text{NON è un intervallo.}$$

**Tipologia degli intervalli limitati.** Siano  $a, b \in \mathbb{R}$ , con  $a < b$ . Distinguiamo quattro tipi di intervalli *limitati* (nel senso della Definizione 1.4.4):

- $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$  *intervallo aperto,*
- $[a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$  *intervallo semiaperto a destra,*
- $(a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$  *intervallo semiaperto a sinistra,*
- $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$  *intervallo chiuso.*

Dato un intervallo  $I$  limitato, si definisce ampiezza dell'intervallo il numero  $\sup(I) - \inf(I)$ .

**Definizione 1.4.13** (Intorno di un punto). Dati  $x_0 \in \mathbb{R}$  e  $r > 0$ , chiamiamo intorno aperto (rispettivamente, chiuso) di  $x_0$  di raggio  $r$  l'intervallo  $(x_0 - r, x_0 + r)$  (risp., l'intervallo  $[x_0 - r, x_0 + r]$ ). Denoteremo l'intorno aperto  $(x_0 - r, x_0 + r)$  anche con il simbolo  $I(x_0, r)$ .

N.B.: si ha che

$$I(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\}.$$

**La retta reale estesa.** Estendiamo la retta reale  $\mathbb{R}$  con i simboli  $+\infty$  e  $-\infty$ , **che non sono da considerarsi numeri reali!!!!** In effetti, osserviamo che

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists y \in \mathbb{R} : y > x$$

in altri termini, non esistono maggioranti reali per l'insieme  $\mathbb{R}$ . Analogamente,

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists y \in \mathbb{R} : y < x$$

cioè l'insieme  $\mathbb{R}$  non ammette minoranti (in  $\mathbb{R}$ ). Li introduciamo quindi con la seguente

**Definizione 1.4.14.** Definiamo il simbolo  $+\infty$  mediante la disuguaglianza

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x < +\infty. \tag{1.4.7}$$

Definiamo il simbolo  $-\infty$  mediante la disuguaglianza

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x > -\infty. \tag{1.4.8}$$

Chiamiamo retta reale estesa l'insieme  $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ .

Osserviamo che  $\overline{\mathbb{R}}$  eredita da  $\mathbb{R}$  la relazione d'ordine, completata dalle disuguaglianze (1.4.7)–(1.4.8). Quindi  $(\overline{\mathbb{R}}, \leq)$  è un insieme totalmente ordinato, e si ha che

- per ogni  $A \subset \overline{\mathbb{R}}$ ,  $+\infty$  è un maggiorante per  $A$ ;
- per ogni  $A \subset \overline{\mathbb{R}}$ ,  $-\infty$  è un minorante per  $A$ .

**Teorema 1.4.15.** *Per ogni  $A \subset \overline{\mathbb{R}}$ , esistono  $\sup(A)$ ,  $\inf(A) \in \overline{\mathbb{R}}$ . In particolare, se  $A \subset \mathbb{R}$ , si ha che*

1.  $\sup(A) = +\infty$  se e solo se  $A$  non è superiormente limitato;
2.  $\inf(A) = -\infty$  se e solo se  $A$  non è inferiormente limitato;
3.  $\sup(\emptyset) = -\infty$  e  $\inf(\emptyset) = +\infty$ .

*Dimostrazione.* Dimostriamo solo che  $\sup(\emptyset) = -\infty$  (con un ragionamento analogo (**esercizio!**) si ottiene anche che  $\inf(\emptyset) = +\infty$ ). Innanzitutto osserviamo che

$$\text{l'insieme dei maggioranti di } \emptyset \text{ è } \overline{\mathbb{R}}. \quad (1.4.9)$$

In effetti, proviamo a negare la (1.4.9):  $\exists y \in \overline{\mathbb{R}}$  che non è un maggiorante per  $\emptyset$ , cioè  $\exists y \in \overline{\mathbb{R}}$  tale che  $\exists x \in \emptyset$  verificante  $x > y$ . Ma questa affermazione è palesemente falsa, in quanto contiene il termine  $\exists x \in \emptyset$ . Allora (1.4.9) è vera. Tenendo conto della definizione di  $\sup$ , concludiamo che  $\sup(\emptyset) = -\infty$ .  $\square$

**Intervalli illimitati.** Possiamo ora introdurre la notazione per gli intervalli illimitati. Sia  $a \in \mathbb{R}$ . Distinguiamo quattro tipi di intervalli:

- $(a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$  *semiretta aperta a sinistra,*
- $(-\infty, a) := \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$  *semiretta aperta a destra,*
- $[a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$  *semiretta chiusa a sinistra,*
- $(-\infty, a] := \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$  *semiretta chiusa a destra.*

Il simbolo  $(-\infty, +\infty)$  è un modo alternativo di denotare  $\mathbb{R}$ , mentre  $[-\infty, +\infty]$  denota la retta reale estesa  $\overline{\mathbb{R}}$ .